

Agil-S[®] 100 EC

Szybkość, pewność, niezawodność!

 HERBICYD



Skutecznie rozwiązuje
problem chwastów
jednoliściennych
w szerokim
zakresie upraw.



ADAMA

Agil-S 100 EC

- ▶ najszybszy dostępny graminiacyd,
- ▶ niezwykle skuteczny na większość chwastów jednoliściennych,
- ▶ formułacja o małych restrykcjach środowiskowych,
- ▶ oszczędny w stosowaniu dzięki elastycznym dawkom,
- ▶ precyzyjne dawkowanie w zależności od występującego zachwaszczenia,
- ▶ zawiera substancję aktywną propachizafop,
- ▶ możliwość stosowania w warzywach i uprawach małoobszarowych.



samosiewy zbóż
przed zabiegiem



zasychające
samosiewy zbóż

ŁAGODNY – dla roślin uprawnych

Lepsze dopasowanie do technologii wymagających zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych.
Herbicydy zwalczające chwasty dwuliścienne, których nie można mieszać z Agil-S 100 EC, stosować 3 dni przed lub 3 dni po jego zastosowaniu.
Szerokie spektrum chronionych upraw.



Szybka absorpcja do liści



Systemiczne przeniesienie do tkanek merystematycznych



Zakłócenie procesów w chloroplastach



Zahamowanie funkcji życiowych komórek



Chlorozy młodych tkanek roślin



Zamieranie roślin

Uwaga!

Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na skuteczność działania środka.

MNIEJ UCIAŹLIWY – dla środowiska

Tylko 1 metr – zalecana strefa ochronna od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, dzięki nowej, unikalnej formułacji.



Agil-S 100 EC – niezwykle skuteczny na większość chwastów jednoliściennych



samosiewy zbóż




perz właściwy



chwastnica jednostronna



włośnica zielona



owies głuchy



miotła zbożowa

Agil-S 100 EC – znakomita skuteczność i oszczędność dzięki elastycznemu dawkowaniu w zależności od występującego zachwaszczenia

1. Samosiewy zbóż i miotła zbożowa.

Zalecana dawka Agil-S 100 EC: 0,5-0,7 l/ha

w zależności od faz rozwojowych chwastów.

Agil-S 100 EC

| | | |
|--|---|--|
| Faza: od 3 do 5 liści (początek krzewienia) BBCH 13-21 | Faza: krzewienie (2-4 rozkrzewienia) BBCH 22-24 | Faza: od pełni krzewienia do początku strzelania w źdźbło (1 kolanko) BBCH 25-30 |
| 0,5 l/ha | 0,6 l/ha | 0,7 l/ha |



2. Jednoroczne chwasty jednoliścienne:

chwastnica jednostronna, owies głuchy, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała.

Zabieg wykonać od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia, BBCH 13-29.

Zalecana dawka Agil-S 100 EC: 0,6 l/ha.

3. Perz właściwy.

Zabieg wykonać w fazie 3-6 liści perzu właściwego BBCH 13-16.

Zalecana dawka Agil-S 100 EC: 1,25-1,5 l/ha

lub w technologii dawek dzielonych

Agil-S 100 EC: 2 x 0,6 l/ha.

Agil-S 100 EC – zarejestrowany we wszystkich istotnych uprawach

Ziemniak

Dawkę produktu dostosować do zakresu i fazy rozwojowej zwalczanych chwastów. Zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, od początku fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryte (BBCH 10-35).

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha



0 kielkowanie 10 wschody 20 tworzenie łodygi 30 wzrost na długość 40 zawiązywanie bulw

Rzepak ozimy

Dawkę produktu dostosować do zakresu i fazy rozwojowej zwalczanych chwastów. Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu głównego – rozeta (BBCH 12-30).

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha



00 liścienie rozwinięte 10 2 liście 12 8 liści 18 wydłużanie pędu głównego 32 pąki kwiatowe rozwinięte nad najmłodszymi liśćmi 53 kwiatostan główny nadal zamknięty 55 kwiatostan główny zamknięty

Burak

Dawkę produktu dostosować do zakresu i fazy rozwojowej zwalczanych chwastów. Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści, do momentu gdy zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi (BBCH 12-35).

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha



10 12 14 16 35

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz aplikację Agro Porada



Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska